

编号：浙 PF20220129

茯苓皮配方颗粒

Fulingpi Peifangkeli

【来源】 本品为多孔菌科真菌茯苓 *Poria cocos* (Schw.) Wolf 菌核的干燥外皮经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取茯苓皮饮片 16000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为 3.1%~5.8%），加辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加辅料适量，混匀，制粒，制成 1000g，即得。

【性状】 本品为浅棕色至灰棕色的颗粒；气微、味淡。

【鉴别】 取本品 1.2g，研细，加乙酸乙酯 25ml，加热回流 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取茯苓皮对照药材 0.1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版 通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（4:1:0.2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典 2020 年版通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 同[含量测定]项。


参照物溶液的制备 取茯苓皮对照药材 2g，同供试品溶液的制备方法制成对照药材参照物溶液；另取[含量测定]项下的对照品溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 同[含量测定]项。

测定法 分别精密吸取供试品溶液与参照物溶液各 10 μ l，注入液相色谱仪，

测定，即得。

供试品色谱中应呈现 5 个特征峰, 应与对照药材参照物色谱中的 5 个特征峰保留时间相对应, 其中峰 3 应与对照品参照物峰相对应。与猪苓酸 C 对照品参照物峰相对应的峰为 S 峰, 计算各特征峰与 S 峰的相对保留时间, 其相对保留时间应在规定值的 $\pm 10\%$ 范围之内。规定值为: 0.53 (峰 1), 0.71 (峰 2), 1.53 (峰 4), 1.60 (峰 5)。



对照特征图谱

峰 1: 茯苓酸 B 峰 2: 茯苓酸 A 峰 3 (S): 猪苓酸 C

参考色谱柱: Agilent ZORBAX Eclipse XDB C₁₈, 250mm×4.6mm, 5 μ m

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定 (中国药典 2020 年版 通则 0512)。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法 (中国药典 2020 年版 通则 2201) 项下的热浸法测定, 用乙醇作溶剂, 不得少于 35.5%。

【含量测定】 照高效液相色谱法 (中国药典 2020 年版通则 0512) 测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相 A，以 0.05%磷酸溶液为流动相 B，按照下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为 241nm；柱温为 35℃。理论板数按猪苓酸 C 峰计算应不低于 2500。

时间（分钟）	流动相 A（%）	流动相 B（%）
0~5	55→57	45→43
5~35	57→60	43→40
35~35.01	60→90	40→10
35.01~60	90→100	10→0

对照品溶液的制备 取猪苓酸 C 对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 含 10 μ g 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取供试品适量，研细，取约 1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇 20ml，密塞，称定重量，加热回流 30 分钟，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每 1g 含猪苓酸 C ($C_{31}H_{46}O_4$) 应为 25 μ g~84 μ g。

【规格】 每 1g 配方颗粒相当于饮片 16g。

【贮藏】 密封。